KLINIKUM
DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN

CAMPUS GROSSHADERN
CAMPUS INNENSTADT

MEDIZINISCHE KLINIK UND POLIKLINIK II - DIREKTORIN PROF DR JULIA MAYERLE

MUNICH MASTERCLASS OF GASTROENTEROLOGY

Pathologie des Ösophaguskarzinoms einschließlich seiner Vorläuferläsionen

JENS NEUMANN

Der **Falk Foundation e.V.** unterstützt das Referat, ist jedoch nicht für dessen Inhalt verantwortlich.

Inhalt des Referats obliegt der wissenschaftlichen Freiheit des Referenten.

Offenlegung von Interessenskonflikten

- Referent: Jens Neumann
- Ich habe folgende Verbindungen zu Unternehmen offenzulegen:
 - Beratendes Gremium/Komitee: Pierre Fabre
 - Referent: Roche, Pfizer, BMS, Falk

- Normale Histologie und Grundbegriffe
- WHO-Klassifikation und Epidemiologie des Ösophaguskarzinoms
- Adenokarzinom des distalen Ösophagus und Barrett-Mukosa
- Plattenepithelkarzinom inkl. Vorläuferläsionen
- Seltenen Sondertypen des Ösophaguskarzinoms
- Histopathologische Aufarbeitung und TNM-Klassifikation

Normale Histologie des Ösophagus

Metaplasie

Umwandlung eines differenzierten Gewebes in ein anderes reifes/differenziertes Gewebe

Intraepitheliale Neoplasie

- Begriffserklärung -

Synonym: Dysplasie

Definition: Eindeutige neoplastische bzw. autonome intraepitheliale Zellproliferation *ohne* Invasion

→ Geht mit einem **erhöhten Malignitätsrisiko** einher und ist gekennzeichnet durch Veränderungen der epithelialen Architektur, zelluläre Atypien und Ausreifungsstörungen.

Histologische Kriterien:

- Zellpolymorphie
- Kernhyperchromasie
- Nukleolenvergrößerung
- Hohe Kern/Plasma-Relation
- gesteigerte Mitoserate
- Architekturstörung
- Polaritätsverlust

normal

Dysplasie

Karzinom des distalen Ösophagus

- Topographische Definition -

Ein Tumor dessen **Zentrum** in einem Abstand von **2 cm** vom ösophago-gastralen Übergang liegt **und in den Ösophagus hineinreicht**, wird nach dem Schema der Ösophaguskarzinome klassifiziert.

Tumoren, die den ösophago-gastralen Übergang einbeziehen und deren **Zentrum** innerhalb der **proximalen 2 cm der Cardia** liegt (Siewert-Typen I und II) werden nach dem Schema für Ösophaguskarzinome klassifiziert.

WHO-Klassifikation

4th Edition 2010

Plattenepithelkarzinom
Adenokarzinom
Adenoid-zystisches Karzinom
Adenosquamöses Karzinom
Basaloides Plattenepithelkarzinom
Mucoepidermoides Karzinom
Spindelzell Karzinom
Verruköses Karzinom
Undifferenziertes Karzinom

WHO-Klassifikation

5th Edition 2019

Adenokarzinom NOS
Adenoid-zystisches Karzinom
Mucoepidermoides Karzinom
Adenosquamöses Karzinom
Plattenepithelkarzinom

- Verruköses Karzinom
- Spindelzell Typ
- Basaloides Plattenepithelkarzinom

Undifferenziertes Karzinom NOS

Epidemiologie des Ösophaguskarzinoms

Prozentualer Anteil ausgewählter Krebserkrankungen in Deutschland

Prozentualer Anteil an der Zahl der Krebssterbefälle in Deutschland

Epidemiologie des Ösophaguskarzinoms

Adenokarzinom

Ein sog. Barrett-Karzinom liegt dann vor wenn sich im Randbereich des Karzinoms Vorläuferläsionen im Sinne einer Barrett-Mukosa mit/ohne Dysplasie nachweisen lassen

Barrett-Metaplasie - Endoskopie

Barrett-Ösophagus

Barrett-Ösophagus

Alcian-PAS

Barrett-Ösophagus

Vereinigte Staaten

Deutschland

Japan/UK

H&E

Alcian-PAS

- Intestinale Metaplasie
- Becherzellen

- Zylinderepithel
- Becherzellen

- Zylinderepithel
- mit/ohne intestinale Metaplasie (nur Japan)

Graduierung Barrett Dysplasie

Niedriggradige

IEN

Geringe Dysplasie

Hochgradige

IEN

Mäßige Dysplasie

Schwere Dysplasie
(Carcinoma in situ)

Graduierung Barrett Dysplasie

driggradige

IEN

Geringe Dysplasie

6.18.

Konsensbasierte Empfehlung

modifiziert 2018

EK

Bei histologischer Diagnose einer IEN/Dysplasie im Barrett-Ösophagus soll der Prozess einer kompetenten (dokumentierten) pathologischen Zweitmeinung im Sinne eines Vier-Augen-Prinzips durchgeführt werden. Bei Dissens oder Unsicherheit bezüglich der Dysplasiediagnose soll eine externe Begutachtung erfolgen.

Konsensstärke

Konsens (93 %)

Hochgradige

IEN

Schwere Dysplasie
(Carcinoma in situ)

Barrett-Ösophagus

- Metaplasie-Dysplasie-Karzinom-Sequenz -

Normal Lining

Barrett's Esophagus

with low-grade dysplasia

with high-grade dysplasia

Invasive carcinoma

Barrett-Ösophagus

Barrett-Ösophagus

- Molekulare Karzinogenese -

Plattenepithelkarzinom des Ösophagus - Risikofaktoren -

Gruppe	Beispiele
Genussmittel	Alkohol Tabakabusus
Diätische Faktoren	Nitrosamine Mykotoxine Scharfe Gewürze
Berufliche Exposition	Vulkanisierarbeiter Silikate
Infektiöse Agenzien	Papillomviren
Chronische Irritation	Thermisch Mechanisch Achalasie Verätzung Ösophagus-Divertikel
Verschiedenes	Sprue Sklerodermie Perniziöse Anämie Z. n. Strahlentherapie
Genetische Disposition

Graduierung Plattenepitheldysplasie

Niedriggradige

IEN

Geringe Dysplasie

Hochgradige

IEN

Mäßige Dysplasie

Schwere Dysplasie
(Carcinoma in situ)

Differentialdiagnose der plattenepithelialen intraepithelialen Neoplasie

Radiogene Atypien!
→ Klinische Angaben!

Reaktive Atypien bei
Epithelregeneration
→ makroskopischer / endoskopischer
Befund!

Plattenepitheldysplasie

Karzinogenese Plattenepithelkarzinom

Plattenepithelkarzinom des Ösophagus

Plattenepithelkarzinom des Ösophagus - Graduierung -

Eigenschaft	Grad 1 (hoch differenziert)	Grad 2 (mäßig differenziert)	Grad 3 (wenig differenziert)
Zytologische Atypien	mild	Moderat	anaplastisch
Verhornung	Oft reichlich	Weniger prominent	Kann fehlen
Interzellulärbrücken	prominent	gelegentlich	Wenige bis keine
Mitosen	selten	gesteigert	reichlich
Tumorrand	„pushing“/gut umschrieben	unregelmäßig	Infiltrativ/“ill defined“

Plattenepithelkarzinom des Ösophagus - Sonderformen -

Sarkomatoid

Verrukös

Basaloid

Adenosquamös

Ösophaguskarzinom - Seltene Sonderformen -

Adenoid-zystisches Karzinom

Mukoepidermoides Karzinom

Aufarbeitung Mukosektomie-Präparat

schwarz blau schwarz

TNM-Klassifikation

für Karzinome des Ösophagus einschließlich des ösophagogastralen Übergangs

- pT1a Lamina propria oder Muscularis mucosae
- pT1b Submucosa
- pT2 Muscularis propria
- pT3 Adventitia
- pT4a Pleura, Perikard, Vena azygos, Zwerchfell oder Peritoneum
- pT4b Aorta, Wirbelkörper oder Trachea

- N1 1-2 regionäre LK-Metastasen
- N2 3-6 regionäre LK-Metastasen
- N3 7 oder mehr regionäre LK-Metastasen

M1 Fernmetastasen

Barrett-Karzinom - Klassifikation -

TNM-Klassifikation 2010

pT1a
Infiltration der Mukosa

pT1b
Infiltration der Submukosa

Muscularis
propria

Japanische Klassifikation Frühkarzinome

M1: HG-IEN (HGD), Cis
M2: Infiltration der Lamina propria
M3: Muscularis mucosae

SM1: Infiltration oberes Drittel
SM2: Infiltration mittleres Drittel
SM3: Infiltration unteres Drittel

Residualtumor (R) - Klassifikation

- R0 Kein Residualtumor
- R1 Mikroskopischer Residualtumor
- R2 Makroskopischer Residualtumor

Bewertung:
Proximaler und distaler Resektatrand
sowie zirkumferentieller Resektatrand

ypTNM-Klassifikation nach neoadjuvanter Therapie

ypTNM-Kategorien

- Kategorisierung durch Nachweis vitaler Tumorzellen
- Unabhängig von der Masse (Zahl) vitaler Tumorzellen

ypT3 bei TRG 0

ypT3 bei TRG 3

Wichtige Zusatzinformation: Tumorregressionsgrad

Regressionsgrad nach neoadjuvanter Therapie

Mandard (Ösophaguskarzinome)	Becker (Magenkarzinome)
TRG 1: keine Tumorzellen, Fibrose in allen Wandschichten (komplette regression)	TRG 1a: Kein Karzinom nachweisbar
TRG 2: Einzelne residuelle Tumorzellen in der Fibrose nachweisbar	TRG 1b: < 10 % Karzinom nachweisbar
TRG 3: Vermehrter Nachweis einzelner Tumorzellen, die Fibrose dominiert aber noch	TRG 2: 10 – 50 % Karzinom nachweisbar
TRG 4: Residuelle Tumorzellen überwachsen die Fibrose	TRG 3: > 50 % Karzinom nachweisbar
TRG 5: Fehlen von regresiven Veränderungen	

TRG 1 / TRG 1a

TRG 2 oder 3 / TRG 1b

TRG 4 / TRG 2

TRG 4 oder 5 / TRG 3

Key Features

- Die Inzidenz des Ösophaguskarzinoms hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen und es kommt zu einer Verschiebung hin zu mehr Adenokarzinomen
- Nach der neuen WHO-Klassifikation wird die Dysplasie/IEN nur noch in low und high grade unterteilt
- Die histologischen Kriterien für die Diagnose einer Barrett-Mukosa sind international unterschiedlich definiert
- In der Biopsie-Diagnostik sind genaue Angaben über die genaue Entnahmelokalisation wichtig
- Bei Zustand nach neo-adjuvanter Therapie sollte eine Regressions-Graduierung vorgenommen werden unter Angabe der verwendeten Graduierungs-Schemas

LMU

LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

jens.neumann@med.uni-muenchen.de