

EINSCHLUSSKRITERIEN:

- **Alter: 15 – 40 Jahre**
- **Dauer: < 24 Monate**
- Diagnosen:
 - **Ersterkrankung Depression**
(F32.x)
 - **Ersterkrankung Psychose**
(F20.x, F22.x, F23.x, F28, F29)
 - **Prodrom / Risikofaktoren für Psychose**
 - Positive Familienanamnese
 - (abgeschwächte/kurze) psychotische Symptome

AUSSCHLUSSKRITERIEN:

- **Antipsychotika > 3 Monate**
(in Zieldosis für Ersterkrankte)
- **Z.n. Schädeltrauma**
mit Bewusstlosigkeit
- **Alkoholabhängigkeit**
(auch in Vorgeschichte)
- **Politoxikomanie**
(auch in Vorgeschichte)
- **Somatische / neurologische Erkrankungen mit Auswirkung auf ZNS** (auch in Vorgeschichte)
- **IQ < 70**
- **Kontraindikationen für MRT**
- **schlechte Deutschkenntnisse**

Substanz	Empfohlene Startdosis (mg/d)	Zieldosis Ersterkrankte (mg/d)
Atypika		
Amisulprid	200	100–300
Aripiprazol	(10)–15	15–(30)
Clozapin ³	25	100–250
Olanzapin	5–10	5–15
Quetiapin	50	300–600
Risperidon	2	1–4
Ziprasidon	40	40–80
Konventionelle Antipsychotika		
Fluphenazin	0,4–10	2,4–10
Flupentixol	2–10	2–10
Haloperidol	1–10	1–4
Perazin	50–150	100–300
Perphenazin	4–24	6–36
Pimozid	1–4	1–4
Zotepin	25–50	50–150
Zuclopenthixol	2–50	2–10

Anmeldung: oemer.oetztuerk@med.uni-muenchen.de

Telefonnummer: 089440055860