

STS23 Notwendige Blutentnahmemengen in der Pädiatrie

Geforderte Entnahmemengen:

Bezeichnung	Alter	Notwendige Probenmenge
Neugeborene / Kreißsaal	Bei Geburt	vornehmlich 7,5 ml EDTA Cordblut
Frühgeborene / Neugeborene	Neonatalogie	0,6ml - 1,2 ml EDTA
Kinder	< 12 Monate	1,2 ml EDTA
Kinder	1 - 5 Jahre	1,2 ml EDTA für Blutgruppe 1,2 ml EDTA für Kreuzprobe
Kinder	6 – 10 Jahre	1,2 ml EDTA für Blutgruppe 2,7 ml EDTA für Kreuzprobe
Kinder:	10 - 14 Jahre	2,7 ml EDTA für Blutgruppe 2,7 ml für Kreuzprobe
Jugendliche	>14 Jahre	2,7 ml EDTA für Blutgruppe 7,5 ml EDTA für Kreuzprobe
Erwachsene	>18 Jahre	7,5 ml EDTA für Blutgruppe 7,5 ml EDTA für Kreuzprobe

Folgen – Bemerkungen für die Steuerstellen ATMZH:

- Die Röhrchen müssen vollständig gefüllt sein.
- Bei Übersendung <1,2ml EDTA bleibt nach Durchführung der Bestimmungen ggf. kein Rest mehr.
- Es werden keine Untersuchungen behelfsmäßig mit zu wenig Material angesetzt.
- Die nötige manuelle Bestimmung wird mit Aufschlag berechnet.
- Bei geringeren Entnahmemengen Rücksendung mit entsprechendem Vermerk auf dem Formular „STS07 Fehler bei der Materialzusendung“
- Die BG-Bestimmung ist **vorrangig**, sollte das Material nicht ausreichen trotz Rücksprache mit Station, werden die Konserven **ungekreuzt** ausgegeben mit dem Vermerk: „zu wenig Material zugeschickt“
- Zur schnelleren Bearbeitung kann die BG-Bestimmung jeweils vorab mit der Medion-Karte geschehen.
- Die eventuell nötige manuelle Bestimmung wird mit Aufschlag berechnet.