

## Anleitung zum Entfernen der Persönlichen Schutzausrüstung („Doffing“) Bei Patienten mit Verdacht auf oder nachgewiesener COVID-19-Erkrankung

### Voraussetzung

- Abfallbehälter und Händedesinfektionsmittel
- im Patientenzimmer bzw. Behandlungsbereich
  - und zusätzlich direkt davor

### WICHTIG

**Die Entfernung muss langsam und umsichtig erfolgen!**

**Hierbei besteht hohe Kontaminationsgefahr!**

**Wann immer möglich mit Unterstützung eines geschulten Beobachters („buddy“) in min. 2 Meter Abstand**

### Ablegen der Handschuhe



Im vorgesehenen Abfallbehälter entsorgen

### Hygienische Händedesinfektion



### Entfernen des Schutzkittels




Die Vorderseite des Kittels ist kontaminiert. Bändchen auf Hüfthöhe öffnen (falls nötig vorsichtig aufreißen) Dabei nur den nicht kontaminierten Innenbereich des Kittels anfassen




langsam von den Schultern herunterrollen  
Kittel von innen zu einem Bündel zusammenrollen  
Im vorgesehenen Abfallbehälter entsorgen

### Hygienische Händedesinfektion



### Abnahme des Augenschutzes



Fassen Sie die Haltebänder hinten oder den Bügel der Brille mit den Händen.

- Bei der Abnahme vom Gesicht kurz die Augen schließen
- Im vorgesehenen Abfallbehälter entsorgen

### Hygienische Händedesinfektion



### Verlassen des Patientenzimmers / Behandlungsbereichs



Überwachung des nächsten Schrittes durch einen geschulten Beobachter („buddy“) (in mind. 2 Meter Abstand)

### Hygienische Händedesinfektion



### Ablegen der Schutzmaske

Für Brillenträger: Eigene Brille jetzt entfernen. Die Vorderseite der Maske dabei nicht berühren, sie gilt als kontaminiert.



Das untere Band mit beiden Händen am Hinterkopf fassen und dieses an den Oberkopf versetzen, so dass beide Bänder zusammen liegen.



Die Augen schließen und beide Bänder anheben und diese langsam über den Kopf führen.

Die Maske in den Abfallbehälter fallen lassen.

### Hygienische Händedesinfektion



Anleitungsvideos und Anleitungen unter:

